

Lyon, le 19 janvier 2023

Madame, Monsieur,  
Cher Confrère, Chère Consœur,

Nous vous informons de l'**arrêt de commercialisation** de notre spécialité :

**IMOVAX POLIO, suspension injectable en seringue préremplie. Vaccin poliomyélitique (inactivé)**  
**Code CIP : 34009 325 755 0 3**

Compte tenu de l'état de nos stocks, cet arrêt de commercialisation devrait intervenir d'ici le 31 mars 2023.

Nous vous rappelons qu'en France, les recommandations vaccinales en vigueur en population générale ne préconisent pas l'utilisation d'un vaccin poliomyélitique monovalent - *cf. extrait du calendrier vaccinal 2022 ci-dessous* :

« Diphtérie, tétanos, poliomyélite :

La primo-vaccination (deux injections suivies d'un rappel) est obligatoire pour tous les enfants nés à compter du 1er janvier 2018.

La vaccination des nourrissons est pratiquée avec un vaccin combiné. **La primo vaccination comporte deux injections à l'âge de 2 mois (8 semaines) et 4 mois, suivies d'un rappel à l'âge de 11 mois. Ce schéma ne doit pas être différé.**

Les rappels ultérieurs sont recommandés à l'âge de 6 ans, et sont réalisés avec un vaccin combiné contenant la valence coqueluche acellulaire (Ca) et les valences tétanique et diphtérique à dose complète d'anatoxine diphtérique et d'antigènes coquelucheux (DTCaPolio), puis, entre 11 et 13 ans, avec un vaccin combiné contenant des doses réduites d'anatoxine diphtérique et d'antigènes coquelucheux (dTCaPolio).

L'ensemble des rappels à l'âge de 6 ans et de 11-13 ans contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, et la coqueluche sont indispensables pour conférer une protection à long terme.

Les rappels de l'adulte sont recommandés aux âges fixes de 25 ans, (à cet âge, le vaccin, inclura la valence coqueluche à dose réduite (ca) chez l'adulte n'ayant pas reçu de vaccination contre la coqueluche au cours des cinq dernières années (dTCaPolio) (cf. chapitre 2.1), 45 ans et 65 ans, puis à 75 ans, 85 ans, etc. (intervalle de dix ans à partir de 65 ans, compte tenu d'une moins bonne réponse vaccinale), en utilisant un vaccin à dose réduite d'anatoxine diphtérique combiné à l'anatoxine tétanique et aux antigènes poliomyélitiques (dTPolio). »

Le service d'information médicale de **SANOFI PASTEUR EUROPE** reste à votre disposition pour toute information complémentaire au numéro de téléphone suivant : 0 800 55 56 58

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher confrère, l'expression de nos salutations distinguées.



**Claire PICHON**  
Pharmacien Responsable  
SANOFI PASTEUR EUROPE